


Fractures de l'extrémité inférieure du radius

Fréquentes. Jeune / haute cinétique, âgé ostéoporotique / basse cinétique.
+/- associées à une fracture de la styloïde ulnaire

Classification → Analytique (Métaphyse, Epiphyse, Ulna)



Imagerie → Radiographie → Poignet face, profil & 3/4s

Vérifier l'absence...


❖ ... de lésions associées

- ♦ Luxation / subluxation radio-ulnaire
- ♦ Entorse ulno-carpienne, entorse scapho-lunaire
- ♦ Fracture de la 1ère rangée du carpe
- ♦ Fracture du coude (tête ulnaire ++) et Syndrome d'Essex-Lopresti

❖ ... de complications

- ♦ Lésion neurologique (**nerf médian** >> ulnaire)
- ♦ Ouverture cutanée (rare)
- ♦ Lésion vasculaire (très rare)
- ♦ Syndrome des loges

Prise en charge (hors complication)



Information du patient

- ♦ Mobilisation des doigts dès les 1ers jours
- ♦ Séquelles : gêne (raideur, perte de force) jusqu'à 6 mois, algodystrophie, arthrose



Index radio-ulnaire
2 +/- 2 mm



Pente radiale de face
20 à 30°



Pente radiale de profil
10 à 15°