

Prophylaxie antirabique & antitétanique

Prophylaxie antirabique

- ◆ Rage = incubation longue (10j → 1 an) → Possibilité d'en prévenir le développement
- ◆ **Situations à risque en France :**
 - **Morsure, griffure ou léchage sur peau lésée ou muqueuse**
 - **Par un animal à risque :**
 - Importé d'une zone d'enzootie rabique
 - Morsure à l'étranger (zone d'enzootie rabique)
 - Chauve-souris
 - **En l'absence de vaccination**
- ◆ Prise en charge → **Orientation vers le centre antirabique du CHU de Rouen**

Centre antirabique du CHU de Rouen

Hôpital Charles Nicolle 1, rue de Germont 76031 ROUEN Cedex
 Tél. 02 32 88 66 80, Fax 02 32 88 09 91, email : sante-voyages@chu-rouen.fr
 Horaires de réponse : Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h — Samedi de 9h à 12h
 Horaires d'ouverture : Sur rendez-vous

Prophylaxie antitétanique (SFMU 2017)

Type de blessure	Personne à jour de ses vaccinations selon le calendrier vaccinal en vigueur	Personne non à jour
Mineure, propre	Pas d'injection Préciser la date du prochain rappel	Administration immédiate d'une dose de vaccin (0,5 mL en intramusculaire ou sous-cutanée profonde) contenant la valence tétanique. Proposer si nécessaire un programme de mise à jour et préciser la date du prochain rappel
Majeure (étendue, pénétrante, avec corps étranger ou traitée tardivement) ou susceptible d'avoir été contaminée par des germes d'origine tellurique	Pas d'injection Préciser la date du prochain rappel	Dans un bras, immunoglobulines tétaniques humaines, 250 UI. Dans la cuisse chez l'enfant < 3 ans ou < 15 kg Dans l'autre bras, administration d'une dose de vaccin anti-tétanique (ou prescription) Proposer si nécessaire un programme de mise à jour et préciser la date du prochain rappel