


Fracture du tarse antérieur (scaphoïde, cuboïde et cunéiformes)

Lorsque les fractures sont non déplacées, le traitement est orthopédique : mise en place d'une attelle plâtrée postérieure, anticoagulants, anti-inflammatoires et antalgiques. Reconvoyer à J5 pour circularisation de l'attelle. Durée : 45 jours. Reconvoyer à J10 pour contrôle radio-clinique. AT : 45 jours.



*Pied vue dorsale : fracture du scaphoïde
Fracture radiale à trait sagittal en regard du 2^{ème} cunéiforme*

Fracture des métatarsiens

Le traitement des fractures non déplacées est orthopédique ou fonctionnel : confection d'une botte en résine avec semelle, anticoagulants, anti-inflammatoires et antalgiques, ou décharge simple avec syndactylie. Reconvoyer à J7 avec radio de contrôle. AT : 30 à 45 jours.

Les fractures déplacées nécessitent un avis spécialisé.

Fractures des phalanges

Le traitement est en général fonctionnel : syndactylie avec l'orteil voisin pendant 3 à 4 semaines. Reconvoyer à J10 pour contrôle radio-clinique. AT : 1 mois.

Avis spécialisé en cas de déplacement important. S'il existe un hématome sous-unguéal, l'évacuer par perforation de l'ongle (trombone chauffé).